



Vorbereitung Koloskopie (Eziclen) verlängert

5 Tage vor der Untersuchung

Sollten Sie auf kernhaltiges Obst, Gemüse und Vollkornprodukte verzichten (z.B. Kiwis, Weintrauben, Melonen, Tomaten, Vollkornbrot mit Körnern). Sie sollten keine blutverdünnenden Medikamente wie Aspirin, Marcumar oder Vergleichbares zu sich nehmen. Diese Medikamente sollten allerdings nur in Rücksprache mit Ihrem Hausarzt abgesetzt werden.

1 Tag vor der Untersuchung

Am Tag vor der Untersuchung sollten Sie so wenig wie möglich essen und besonders viel trinken, z.B. klaren Apfelsaft. Zum Frühstück empfehlen wir leichte Kost wie ein Rührei.

Bei Neigung zu Verstopfung empfehlen wir zum Frühstück und zum Mittagessen nur klare Suppen zu sich zu nehmen.

8:00 Uhr:

Stellen Sie zunächst eine 500ml-Trinklösung zur Darmreinigung her, indem Sie 1 Flasche Eziclen (176 ml) in den beiliegenden Becher gießen und mit Wasser bis zur Markierung auffüllen.

- Trinken Sie diese Lösung langsam verteilt innerhalb einer ½ Stunde (kann eine leicht Übelkeit verursachen).
- Anschließend sollten Sie mindestens 2-3 l Flüssigkeit (mit wenig Farbstoff und wenig Kohlensäure z.B. Wasser, klarer Apfelsaft, klare Suppe oder Tee ohne Milch) Ihrer Wahl trinken.

Sie dürfen alle alkoholfreien klaren Getränke (z.B. Wasser, klarer Apfelsaft, klare Suppe oder Tee ohne Milch) Ihrer Wahl trinken. Um 17 Uhr beginnen Sie mit der Darmreinigung. Sie sollten sich während der Einnahme der Abführlösung in der Nähe einer Toilette aufhalten.

17:00 Uhr:

- Stellen Sie zunächst eine 500ml-Trinklösung zur Darmreinigung her, indem Sie 1 Flasche Eziclen (176 ml) in den beiliegenden Becher gießen und mit Wasser bis zur Markierung auffüllen.
- Trinken Sie diese Lösung langsam verteilt innerhalb einer ½ Stunde (kann eine leicht Übelkeit verursachen).
- Anschließend sollten Sie mindestens 2-3 l Flüssigkeit (mit wenig Farbstoff und wenig Kohlensäure z.B. Wasser, klarer Apfelsaft, klare Suppe oder Tee ohne Milch) Ihrer Wahl trinken.

Am Untersuchungstag

4 Stunden vor der Untersuchung:

- Stellen Sie erneut eine 500ml-Trinklösung zur Darmreinigung her, indem Sie die verbliebene 1 Flasche Eziclen (176 ml) in den beiliegenden Becher gießen und mit Wasser bis zur Markierung auffüllen.
- Trinken Sie diese Lösung wieder langsam verteilt innerhalb einer ½ Stunde.
- Anschließend sollten Sie mindestens 1-2 l Flüssigkeit (mit wenig Farbstoff und wenig Kohlensäure z.B. Wasser, klarer Apfelsaft, klare Suppe oder Tee ohne Milch) Ihrer Wahl trinken.
- Bitte ab 2 Stunden vor der Untersuchung nicht mehr trinken.

Bei weiteren Fragen zur Darmreinigung wenden Sie sich gerne an uns: 06173 - 9968140

Viel Erfolg bei der Darmreinigung wünscht Ihr IFK Team